

キイトルーダ+nab-PTX+CBDCA療法(__クール目: day 1)

実施日	
指示者	指示受

ID

様

cm

kg

(測定日)

m²

1クール(21日間)	day1	day8	day15	~day21
キイトルーダ(200mg/body)	↓	休	休	
nab-PTX(100mg/m ²)	↓	↓	↓	
CBDCA(AUC=6)	↓	休	休	

※4クール終了後
→「キイトルーダ単
独療法/3週間毎」

内服	イメンドカプセルセット
	day1(125mg)、day2 & day3(80mg)

			投与時間
点滴:メイン	生食	250 mL	(:)
側管①[30分]	●キイトルーダ(※フィルター使用)	200 mg	(:)
	生食	50 mL	
側管②[15分]	生食	50 mL	(:)
	アザセロン	1 A	
	デキサート	4 A	
側管③[5分]	生食(※フラッシュ)	50 mL	(:)
側管④[30分]	●アブラキサン	mg	(:)
	(※溶解液以外の生食をあらかじめ抜き取り、調製液の必要量を戻す)		
	生食	50 mL	
側管⑤[5分]	生食(※フラッシュ)	50 mL	(:)
側管⑥[60分]	●カルボプラチン	mg	(:)
	生食	250 mL	

■注意・確認事項

○「キイトルーダ」はインラインフィルター(0.2~5μm)を使用。最終濃度は1~10mg/mLとする。

○「アブラキサン」はインラインフィルターを使用しない。また、特定生物由来製剤のため、

使用後は管理票に必要事項を記入し薬局へ返却すること(20年保管)。

※1V...キイトルーダ100mg/アブラキサン100mg/カルボプラチン50mg・150mg・450mg

■開始基準

- ① 好中球数 1,500/mm³以上
- ② 血小板数 10万/mm³以上
- ③ ヘモグロビン 9g/dL以上
- ④ 総ビリルビン 1.5mg/dL以下

- ⑤ AST/ALT 75IU/L以下、肝転移がある場合150IU/L以下
- ⑥ クレアチニン 1.5mg/dL以下
- ⑦ TSH 正常範囲内、またはFT3およびFT4が正常範囲内

■次コース開始基準

①~⑥

※特に注意を要する副作用(抜粋)

- ・間質性肺疾患 ・大腸炎、重篤な下痢
- ・1型糖尿病 ・肝機能、甲状腺機能障害
- ・皮膚障害 ・infusion reaction

キイトルーダ+nab-PTX+CBDCA療法(____クール目: day 8,15)

実施日	
指示者	指示受

ID

様

cm kg (測定日) m²

1クール(21日間)	day1	day8	day15	~day21
キイトルーダ (200mg/body)	↓	休	休	
nab-PTX (100mg/m ²)	↓	↓	↓	
CBDCA (AUC=6)	↓	休	休	

※4クール終了後
→「キイトルーダ単
独療法/3週間毎」

内服	イメンドカプセルセット
day8 & day15 → 不要	

点滴:メイン	生食	100 mL	投与時間 (:)
側管①[30分]	●アブラキサン	mg	(:)
	(※溶解液以外の生食をあらかじめ抜き取り、調製液の必要量を戻す)		
	生食	50 mL	
側管②[5分]	生食(※フラッシュ)	50 mL	(:)

■注意・確認事項

○「アブラキサン」はインラインフィルターを使用しない。また、特定生物由来製剤のため、使用後は管理票に必要事項を記入し薬局へ返却すること(20年保管)。

※1V…アブラキサン100mg

■開始基準

- | | |
|---------------------------------|--|
| ① 好中球数 1,500/mm ³ 以上 | ⑤ AST/ALT 75IU/L以下、
肝転移がある場合150IU/L以下 |
| ② 血小板数 10万/mm ³ 以上 | ⑥ クレアチニン 1.5mg/dL以下 |
| ③ ヘモグロビン 9g/dL以上 | ⑦ TSH 正常範囲内、または
FT3およびFT4が正常範囲内 |
| ④ 総ビリルビン 1.5mg/dL以下 | |

■次コース開始基準

①~⑥

※特に注意を要する副作用(抜粋)
・間質性肺疾患 ・大腸炎、重篤な下痢
・1型糖尿病 ・肝機能、甲状腺機能障害
・皮膚障害 ・infusion reaction